

Indukuoti skrepliai

Prøvetaking som ledd i utredning av tuberkulose

LITAUISK

Faktai apie tuberkulozę

Tuberkulozė yra liga, kurią sukelia tuberkulozės bakterijos (*M. Tuberculosis*). Bakterijos plinta, kai maži skysčio lašeliai patenka į aplinką aktyvia plaučių tuberkulozės forma sergančiam žmogui kosint, čiaudint, kalbant, juokiantis.

Šiuo oru kvėpuojantys žmonės taip pat gali įkvėpti šių bakterijų ir užsikrėsti. Maždaug 10 % visų užsikrėtusių žmonių kažkuriuo metu išsivysto aktyvi tuberkulozės forma. Siekiant išaiškinti, ar nėra aktyvios tuberkulozės formos, reikia atlikti keletą tyrimų. Vienas jų yra indukuotų skreplių mėginys.

Kaip atliekamas tyrimas? Tyrimo metu jums reikės įkvėpti druskos tirpalo garų iš garintuvo, prijungto prie deguonies baliono. Garai sudirgins kvėpavimo takus, ir jums bus lengviau iš plaučių atkosėti skreplius.

Pasiruošimas. 4 valandas iki tyrimo nieko nevalgykite ir negerkite.

Kaip užsikrečiama tuberkuloze?



Kai imlus / jautrus žmogus įkvėpia lašelius su tuberkulozės bacilomis.



Nuo plaučių tuberkuloze sergančio žmogaus, kurio seilėse / skrepliuose yra tuberkulozės bakterijų. Bakterijos plinta, žmogui kosint, čiaudint, juokiantis, dainuojant arba kalbant.



Apžiokite kandiklį ir tvirtai suspauskite jį lūpomis. Normaliai kvėpuokite, įkvėpdami ir iškvėpdami per burną. Tarpais pora kartų giliai įkvėpkite. Skysčio perteklių (vandenį iš garų) nurykite. Gleivės (seilės) iš burnos nebus naudojamos.



Kai norėsite kosėti, išsiimkite garintuvą ir stipriai keletą kartų atsikosėkite.



Visas iš plaučių atkosėtas gleives išspjaukite tiesiai į mėgintuvėlį. Kad būtų išvengta mėgintuvėlio užteršimo, laikykite mėgintuvėlį po apatine lūpa. Šią procedūrą turite pakartoti kelis kartus. Laikykitės personalo nurodymų. Pasibaigus procedūrai, užsukite dangtelį. Baigę nusiplaukite rankas.

Kas vyksta toliau?

Mėginių rezultatai bus po 6–8 savaičių. Jūs galite būti pakviesti atvykti dar kartą. Remdamasis mėginio rezultatais, gydytojas nuspręs tolimesnius veiksmus.