

نمونه گیری منحنیث بخشی از معاینه توبرکلوز

نکاتی درباره توبرکلوز

توبرکلوز مرضی است که توسط بکتری توبرکلوز (ام توبرکلوزیز) ایجاد می شود. وقتی که شخصی با توبرکلوز فعال در شش های خود گپ می زند و یا سرفه، عطسه یا خنده می کند این بکتری از طریق هوا و قطرات ریز نشر می گردد.

توبرکلوز چطور سبب ایجاد مرض می گردد؟

باسیل این مرض از بلغم شخصی که دچار توبرکلوز شش است منتقل می گردد. این بکتری با سرفه، عطسه، خنده، آواز خواندن یا گپ زدن نشر می گردد.

به شخصی که قطرات ریز حاوی بکتری توبرکلوز را استنشاق می کند منتقل می شود.

اشخاص که این هوا را استنشاق می کنند، بکتری را نیز استنشاق کرده و مریض می شوند. حدود 10 فیصد از اشخاصی که به این بکتری آلوده می شود یک بار در زندگی خود به مرض توبرکلوز دچار می شوند. برای مشخص نمودن اشخاصی که دچار مرض توبرکلوز فعال هستند، باید معاینات مختلفی بشمول تست بلغم انجام شود.

این تست چطور انجام می شود؟

در حین تست شما آب نمک را از طریق یک دستگاه بخار کننده که به اکسیجن متصل است استنشاق می کنید. غبار حاصل سبب تحریک مجاری تنفسی گردیده و سرفه کردن بلغم از شش ها را برایتان آسان تر می کند.

آمادگی

قبل از معاینه به مدت 4 ساعت چیزی نخورید و ننوشید.



دهانی را گاز بگیرید و لبهایتان را محکم اطراف آن نگهدارید. به طور نرمال از طریق دهان تنفس کنید. هر از چندگاهی چند نفس عمیق بکشید. مایع اضافی (میعان شده از غبار) بلعیده می شود. بلغم از تف نباید استفاده شود.



وقتی که می خواهید سرفه کنید، دستگاه بخار کننده را بردارید و چندین بار محکم سرفه کنید.



تمامی بلغمی که از شش هایتان سرفه می کنید را مستقیماً بر روی شیشه تست تف کنید. برای جلوگیری از کثیف شدن شیشه تست این شیشه در ذیل لب پایین نگهداشته می شود.

شما باید این طرز العمل را چندین بار تکرار کنید. دستورات کارمندان را اجرا کنید. بعد از تمام شدن تست درپوش را محکم کنید. در نهایت، دستهایتان را بشوئید.

پس از این چه اتفاقی می افتد؟

نتایج تست ها ظرف مدت 6 تا 8 هفته ارائه خواهد شد. شما برای یک وقت ملاقات دیگر دعوت می شوید. بر اساس نتایج تست، داکتر اقدامات بعدی را مشخص می کند.